



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा

भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 15-09-2023

किशनगंज(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-09-15 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-09-16	2023-09-17	2023-09-18	2023-09-19	2023-09-20
वर्षा (मिमी)	2.0	2.0	0.0	5.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	34.0	34.0	33.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	26.0	26.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	85	85	90	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	50	50	50	55	60
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	15	10	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	110	110	70	90	110
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	4	4	5	6

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आगामी पांच दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आसमान में मुख्यतः बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मध्यम से तेज गति की पूर्वा हवा चलेगी। आईएमडी, पटना के दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान सतही हवा की गति 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे एवं झोंको के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

जो किसान एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें आंधी और बिजली के बारे में शुरुआती अलर्ट के लिए दामिनी ऐप, मौसम आधारित कृषि-सलाह के लिए मेघदूत ऐप, थंडर / बारिश के लिए मौसम और रेन अलार्म ऐप डाउनलोड करना चाहिए। धान में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट (बीएलबी) रोग को नियंत्रित करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन @ 50 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 2.5 किग्रा प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। 12 दिनों के अंतराल पर दो बार करें।

लघु संदेश सलाहकार:

वर्तमान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि खेत की मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खड़ी फसलों में सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति उच्च सापेक्ष आर्द्रता और रात का कम तापमान धान में ब्लास्ट रोग के संक्रमण के लिए अत्यधिक अनुकूल है। 2-3 दिनों के अंतराल पर निगरानी की सलाह दी जाती है। प्रारंभिक लक्षणों में पत्ती के आवरण में प्रकाश केंद्र और अंधेरे सीमाओं के साथ आंख के आकार के धब्बे का विकास शामिल है। बाद की अवस्था में ये धब्बे मिलकर बड़े धब्बे बन जाते हैं।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	धान के खेत में तना छेदक का आक्रमण देखा जाता है, तो प्रोफेनोफोस @ 2 मिली प्रति लीटर पानी या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 डब्ल्यूपी @ 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव साफ मौसम की स्थिति में करने की सलाह दी जानी चाहिए।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	थ्रिप्स के हमले के खिलाफ प्याज की फसल की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए। चिपचिपा पदार्थ (टिपोल 1.0 ग्राम / लीटर) के साथ इमिडाक्लोरप्रिड @ 0.5 मिली प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है, जब आसमान साफ हो।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिये ब्यूटैक्स जैसी उपयुक्त दवाई पशुचिकित्सक के परामर्श से अवश्य दिलवाये।