



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
बिहार कृषि विश्वविद्यालय
सबौर, बिहार



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 19-09-2023

किशनगंज(बिहार) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2023-09-19 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2023-09-20	2023-09-21	2023-09-22	2023-09-23	2023-09-24
वर्षा (मिमी)	37	19	101	24	33
अधिकतम तापमान(से.)	33.6	33.1	29.4	30.9	30.8
न्यूनतम तापमान(से.)	22.3	22.2	20.8	21.2	20.9
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	87	89	94	90	93
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	62	66	83	77	81
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	14	18	21	18	17
पवन दिशा (डिग्री)	77	68	68	68	68
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	8	8	8

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आगामी पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मध्यम से तेज गति की पूर्वा हवा चलेगी। आईएमडी, पटना के दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

सामान्य सलाहकार:

जो किसान एंड्रॉइड मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें आंधी और बिजली के बारे में शुरुआती अलर्ट के लिए दामिनी ऐप, मौसम आधारित कृषि-सलाह के लिए मेघदूत ऐप, थंडर / बारिश के लिए मौसम और रेन अलार्म ऐप डाउनलोड करना चाहिए।

लघु संदेश सलाहकार:

अगले पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को देखते हुए, किसान भाइयों को खड़ी फसल में सिंचाई के लिए प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	अगात बोई गई धान की फसल में गंधी बग कीट की निगरानी की सलाह दी जाती है, जो दाना बनने की अवस्था में पहुंचता है। इससे दुग्ध अवस्था के दौरान फसल के दानों को काफी नुकसान होता है। परिणाम स्वरूप धान का दाना सफेद और चैफी हो जाता है। यदि 1-2 कीड़े/बीट में दिखाई दे तो इसको नियंत्रित करने के लिये फॅलिडोल पाउडर @ १०-१५ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डस्टिंग सुबह मे या देर शाम को करे।
चावल	वर्तमान मौसम की स्थिति में, धान के खेत में ब्राउन प्लांट हॉपर (बीपीएच) की निरंतर निगरानी की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसल के बीच में प्रवेश करें और पौधे के मूल भाग पर मच्छर जैसे कीट देखें। यदि कीट की संख्या ईटीएल से अधिक हो तो पाइमेट्रोजीन @ 120 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी/एकड़ में स्प्रे करने की सलाह दी जाती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नींबू	नींबू के पौधे में साइटस कैंकर रोग को नियंत्रित करने के लिए, मिट्टी को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 5 ग्राम प्रति लीटर पानी से भीगना और उसी रसायन @ 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के पत्ते पर स्प्रे को साफ मौसम की स्थिति में 2-3 बार सलाह दी जानी चाहिए। गंभीर रोग की स्थिति में पौधे को उखाड़ देना चाहिए।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पोटाशियम परमैंगनेट का 1 प्रतिशत पेस्ट पैर और मुंह में लगाने से पैर और मुंह के रोग से ग्रसित पशु ठीक हो जाते हैं। घाव पर एंटीसेप्टिक लोशन भी लगाएं। इसके साथ ही बोरिक एसिड और ग्लिसरीन का पेस्ट मुंह पर लगाना चाहिए। संक्रमित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए।